

**LISEZ CE DOCUMENT POUR ASSURER UNE UTILISATION SÉCURITAIRE ET EFFICACE DE
VOTRE MÉDICAMENT**

RENSEIGNEMENTS POUR LE PATIENT SUR LE MÉDICAMENT

PrXYLOCARD®
Chlorhydrate de lidocaïne injectable

Lisez attentivement ce qui suit avant de commencer à prendre **XYLOCARD** et lors de chaque renouvellement de prescription. L'information présentée ici est un résumé et ne couvre pas tout ce qui a trait à ce médicament. Parlez de votre état médical et de votre traitement à votre professionnel de la santé de demandez-lui s'il possède de nouveaux renseignements au sujet de **XYLOCARD**.

Pourquoi XYLOCARD est-il utilisé?

XYLOCARD est utilisé pour traiter les anomalies du rythme cardiaque pouvant survenir lors

- d'interventions telles qu'une chirurgie du cœur;
- d'une crise cardiaque ou d'autres troubles cardiaques.

Comment XYLOCARD agit-il?

XYLOCARD est un médicament antiarythmique. Il agit en réduisant le nombre de battements de cœur par minute et aide à ramener le rythme cardiaque à la normale.

Quels sont les ingrédients de XYLOCARD?

Ingrédients médicinaux : chlorhydrate de lidocaïne

Ingrédients non médicinaux : chlorure de sodium, hydroxyde de sodium (et/ou acide chlorhydrique) et eau pour injection

XYLOCARD est disponible sous les formes posologiques qui suivantes :

Solution : 20 mg/mL

Ne prenez pas XYLOCARD si :

- vous êtes allergique ou sensible au chlorhydrate de lidocaïne, à l'un des ingrédients non médicinaux de XYLOCARD ou à d'autres anesthésiques locaux (p. ex. prilocaïne, mépivacaïne ou bupivacaïne).
- vous présentez une maladie cardiaque, comme le syndrome d'Adams-Stokes ou un bloc sino-auriculaire, auriculo-ventriculaire ou intraventriculaire de degré avancé.
- vous présentez une arythmie supraventriculaire
- vous présentez une dépression myocardique sévère

Consultez votre professionnel de la santé avant de prendre XYLOCARD, afin de réduire la possibilité d'effets secondaires et pour assurer la bonne utilisation du médicament.

Mentionnez à votre professionnel de la santé tous vos problèmes de santé, notamment :

- votre rythme cardiaque est lent;
- le taux de potassium dans votre sang est faible;
- vous prenez un médicament appelé digitale
- vous souffrez d'épilepsie;
- votre tension artérielle est basse (basse pression);
- vous avez des problèmes de cœur, de foie ou de reins;
- vous avez reçu un diagnostic de porphyrie;

- vous êtes en état de choc grave;
- vous êtes en enceinte ou prévoyez le devenir;
- vous allaitez ou prévoyez allaiter.

Informez votre professionnel de la santé de tous les produits de santé que vous prenez, y compris les médicaments, les vitamines, les minéraux, les suppléments naturels ou les produits de médecine alternative.

Les produits qui suivent pourraient être associés à des interactions médicamenteuses avec XYLOCARD :

- Antiarythmiques (utilisés pour traiter les troubles cardiaques) comme la mexilétine et l'amiodarone.
- Cimétidine (utilisée pour traiter les troubles gastriques).
- Fluvoxamine (antidépresseur).
- Bêtabloquants (utilisés pour traiter les troubles cardiaques) comme le métoprolol, le nadolol et le propranolol.
- Médicaments utilisés pour traiter l'épilepsie et les convulsions comme la carbamazépine, le phénobarbital, la phénytoïne et la primidone.

Comment prendre XYLOCARD?

- XYLOCARD doit être administré en injection intraveineuse par un professionnel de la santé.
- Votre rythme cardiaque et votre tension artérielle seront surveillés pendant votre traitement par XYLOCARD.

Votre médecin pourrait vous donner une seule injection de XYLOCARD. Selon votre condition, vous pourriez avoir besoin d'une perfusion de XYLOCARD.

Dose habituelle :

Le médecin déterminera la dose à administrer d'après vos besoins individuels.

Surdosage :

L'administration d'une trop grande quantité de XYLOCARD peut entraîner des effets secondaires graves. Les premiers signes d'une surdose de XYLOCARD sont les suivants :

- engourdissement des lèvres et autour de la bouche,
- sensation de tête légère ou étourdissements,
- vision trouble,
- trouble de l'ouïe et/ou bourdonnements dans les oreilles.

Si vous croyez qu'on vous a administré trop de XYLOCARD, à vous ou à la personne que vous soignez, communiquez immédiatement avec votre professionnel de la santé, le service des urgences d'un hôpital ou votre centre antipoison régional même si vous ne présentez pas de symptômes.

Quels sont les effets secondaires qui pourraient être associés à XYLOCARD?

En prenant XYLOCARD, vous pourriez ressentir des effets secondaires autres que ceux qui figurent dans cette liste. Si c'est le cas, communiquez avec votre professionnel de la santé.

Les effets secondaires peuvent comprendre les suivants :

- nausées, vomissements
- étourdissements, sensation de tête légère
- somnolence

- sensations de chaleur, de froid ou d'engourdissement
- sensibilité au bruit, bourdonnements dans les oreilles

Effets secondaires graves et mesure à prendre			
Symptôme ou effet	Communiquez avec votre professionnel de la santé		Cessez de prendre le médicament et consultez un médecin immédiatement
	Uniquement si l'effet est sévère	Dans tous les cas	
COURANT Sensations anormales : picotements, engourdissement autour de la bouche et/ou de la langue		√	
Battements cardiaques irréguliers ou lents		√	
Tension artérielle basse : étourdissements, évanouissements, sensation de tête légère, fatigue. Peut survenir quand une personne passe d'une position assise ou couchée à une position debout.		√	
RARE Étourdissements prolongés		√	
Crise cardiaque : douleur constrictive intense à la poitrine, battements cardiaques irréguliers, essoufflement			√
Réaction allergique : éruption cutanée, urticaire, enflure du visage, des lèvres, de la langue ou de la gorge, réactions anaphylactiques,			√

Effets secondaires graves et mesure à prendre			
Symptôme ou effet	Communiquez avec votre professionnel de la santé		Cessez de prendre le médicament et consultez un médecin immédiatement
	Uniquement si l'effet est sévère	Dans tous les cas	
difficulté à avaler ou à respirer			
Lésion nerveuse : picotements dans les bras et les jambes		√	
Vision brouillée		√	
Troubles du système nerveux : Nervosité, appréhension, euphorie, confusion, soubresauts musculaires, tremblements, convulsions, perte de conscience			√
Arrêt respiratoire : grave difficulté à respirer, perte de conscience			√

En cas de symptôme ou de malaise non mentionné dans le présent document ou d'aggravation d'un symptôme ou d'un malaise vous empêchant de vaquer à vos occupations quotidiennes, parlez-en à votre professionnel de la santé.

Déclaration des effets secondaires

Vous pouvez déclarer les effets secondaires soupçonnés d'être associés avec l'utilisation d'un produit de santé à Santé Canada en :

- Visitant le site Web des déclarations des effets indésirables (<https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medeffet-canada/declaration-effets-indesirables.html>) pour vous informer sur comment faire une déclaration en ligne, par courrier, ou par télécopieur; ou
- Téléphonant sans frais le 1-866-234-2345.

REMARQUE : Consultez votre professionnel de la santé si vous avez besoin de renseignements sur le traitement des effets secondaires. Le Programme Canada Vigilance ne donne pas de conseils médicaux.

Entreposage :

Conservez à la température ambiante (15 °C à 25 °C).
Gardez hors de la portée et de la vue des enfants.

Pour en savoir davantage au sujet de XYLOCARD, vous pouvez :

- Communiquer avec votre professionnel de la santé.
- Lire la monographie de produit intégrale rédigée à l'intention des professionnels de la santé, qui renferme également les renseignements pour le patient sur le médicament. Ce document est publié sur le site Web de Santé Canada (<https://health-products.canada.ca/dpd-bdpp/switchlocale.do?lang=fr&url=t.search.recherche>), le site Web du fabricant www.aspenpharma.ca, ou en téléphonant le 1-844-330-1213.

Ce dépliant a été rédigé par
Aspen Pharmacare Canada Inc.
8 – 1155 North Service Road West
Oakville, ON
L6M 3E3

Les marques de commerce sont la propriété de, ou exploitées sous licence par, le Groupe de sociétés Aspen.

Dernière révision : Le 21 mai 2021