

## RENSEIGNEMENTS SUR LE MÉDICAMENT POUR LE PATIENT

### LISEZ CE DOCUMENT POUR ASSURER UNE UTILISATION SÉCURITAIRE ET EFFICACE DE VOTRE MÉDICAMENT

Pr **ALKERAN<sup>MD</sup>**

**comprimés de melphalan**

Lisez attentivement ce qui suit avant de commencer à prendre ALKERAN et lors de chaque renouvellement de prescription. L'information présentée ici est un résumé et ne couvre pas tout ce qui a trait à ce médicament. Parlez de votre état médical et de votre traitement à votre professionnel de la santé et demandez-lui s'il possède de nouveaux renseignements au sujet d'ALKERAN.

#### Mises en garde et précautions importantes

**ALKERAN doit être prescrit uniquement par un professionnel de la santé qualifié dans l'utilisation de médicaments anticancéreux.**

**Les effets secondaires graves suivants ont été observés chez des patients prenant ALKERAN :**

- **Réaction allergique** : éruption cutanée, urticaire, enflure du visage, des lèvres, de la langue ou de la gorge, difficulté à avaler ou à respirer, battements de cœur rapides.
- **Myélosuppression** : signes et symptômes d'infections (dont la fièvre, les frissons, le mal de gorge, les ulcérations buccales), fatigue, tendance aux ecchymoses, saignement du nez, des gencives ou de la bouche, petits points rouges sur la peau, essoufflement, pâleur de la peau, des lèvres ou du lit unguéal.
- **Troubles pulmonaires causant la mort** : essoufflement qui s'aggrave soudainement, respiration sifflante, endormissement, possiblement accompagné de toux ou de fièvre, respiration douloureuse.
- **Infertilité tant chez les hommes que chez les femmes.**
- **Anomalies congénitales chez les bébés dont la mère ou le père prenait ALKERAN.**
- **Apparition de nouveaux cancers, autres que le cancer pour lequel vous êtes traité.**

#### Pourquoi ALKERAN est-il utilisé?

ALKERAN est indiqué pour :

- pour soulager les symptômes causés par le myélome multiple, un cancer du sang.
- pour soulager les symptômes causés par le cancer épithélial ovarien non résecable (un type de cancer des ovaires).

#### Comment ALKERAN agit-il?

ALKERAN appartient à un groupe de médicaments anticancéreux appelés agents alkylants antinéoplasiques. Ces médicaments agissent en empêchant les cellules cancéreuses de se diviser et de croître.

#### Quels sont les ingrédients des comprimés d'ALKERAN?

Ingrédient médicinal : melphalan.

Ingrédients non médicinaux : dioxyde de silicium colloïdal, crospovidone, hydroxypropylméthyl cellulose, stéarate de magnésium, cellulose microcristalline, polyéthylène glycol 400 et dioxyde de titane

**ALKERAN est offert sous les formes posologiques qui suivent :**

Comprimés de 2 mg

**Ne prenez pas ALKERAN si :**

- vous êtes allergique au melphalan, au chlorambucil ou à tout ingrédient contenu dans ALKERAN;
- votre maladie ne répond pas au traitement par ALKERAN;
- vous êtes traité actuellement ou avez été récemment traité par radiothérapie ou chimiothérapie;
- vous avez été récemment traité par des médicaments semblables à ALKERAN;
- votre nombre de neutrophiles et de plaquettes est bas (les neutrophiles et plaquettes sont des cellules sanguines);
- vous allaitez.

**Consultez votre professionnel de la santé avant de prendre ALKERAN, afin de réduire la possibilité d'effets secondaires et pour assurer la bonne utilisation du médicament. Mentionnez à votre professionnel de la santé tous vos problèmes de santé, notamment si :**

- vous êtes enceinte ou susceptible de le devenir;
- vous allaitez ou planifier le faire. On ne sait pas si ALKERAN passe dans le lait maternel.
- vous avez été vacciné ou envisagez d'être vacciné par un vaccin à virus vivants;
- vous souffrez d'une maladie des reins.

**Autres mises en garde à connaître :**

On a signalé des cas de nouveaux cancers causés par ALKERAN chez certains patients qui ont été traités par ce médicament. Si vous avez des questions ou des inquiétudes ou si vous remarquez de nouveaux symptômes, parlez-en à votre professionnel de la santé.

Si vous devez subir une chirurgie, informez votre professionnel de la santé ou anesthésiste que vous prenez ALKERAN.

Votre professionnel de la santé effectuera des analyses sanguines avant d'entamer le traitement par ALKERAN et avant chaque dose.

**Informez votre professionnel de la santé de tous les produits de santé que vous prenez, y compris les médicaments, les vitamines, les minéraux, les suppléments naturels ou les produits de médecine alternative.**

**Les produits qui suivent pourraient être associés à des interactions médicamenteuses avec ALKERAN :**

- acide nalidixique, un antibiotique utilisé pour traiter les infections bactériennes.
- cyclosporine, utilisée pour prévenir le rejet d'organes chez les personnes ayant subi une greffe d'organe.
- busulfan
- vaccination par des vaccins à virus vivants.

**Comment prendre les comprimés ALKERAN :**

- Vous devez prendre ALKERAN exactement comme votre médecin vous l'a prescrit. Si vous n'êtes pas certain de la quantité de comprimés à prendre ainsi que la fréquence de la prise, communiquez avec

- votre médecin ou pharmacien.
- Avalez vos comprimés entiers avec un peu d'eau.
  - NE PAS briser, écraser ou croquer les comprimés.

#### **Dose habituelle pour adultes :**

Votre médecin vous indiquera combien de comprimés prendre et à quel moment vous devez les prendre. Selon votre réponse au médicament et les résultats de vos analyses sanguines, il est possible que votre posologie soit ajustée.

#### **Manifestations thromboemboliques**

Vous devriez recevoir un traitement prophylactique contre la thromboembolie veineuse pendant au moins les 5 premiers mois de traitement par le melphalan, surtout si vous présentez d'autres facteurs de risques thrombotiques. Votre médecin décidera des mesures à prendre après avoir soigneusement évalué vos facteurs de risque sous-jacents.

Si vous présentez toute manifestation thromboembolique, avisez votre médecin immédiatement, car vous devrez cesser votre traitement par le melphalan et une anticoagulothérapie classique devra être entamée. Une fois que les manifestations thromboemboliques auront été prises en charge, votre médecin décidera si vous devriez reprendre le traitement d'association par le melphalan avec du lénalidomide et de la prednisone ou du thalidomide et de la prednisone ou de la dexaméthasone. Vous devriez poursuivre l'anticoagulothérapie pour la durée du traitement par le melphalan.

#### **Surdosage :**

Si vous pensez qu'on vous a administré, à vous ou à une personne que vous soignez, une trop grande quantité d'ALKERAN, communiquez immédiatement avec votre professionnel de la santé, les urgences d'un hôpital ou le centre antipoison régional, même en l'absence de symptômes.

#### **Dose oubliée :**

Si vous oubliez de prendre une dose, informez-en votre professionnel de la santé le plus tôt possible. Ne doublez pas la dose à la prochaine prise.

#### **Quels sont les effets secondaires qui pourraient être associés à ALKERAN?**

Les suivants ne constituent pas tous les effets secondaires possibles avec la prise d'ALKERAN. Si vous ressentez des effets secondaires qui ne figurent pas sur cette liste, communiquez avec votre professionnel de la santé.

Les effets secondaires peuvent comprendre :

- Chez la femme, les règles peuvent cesser.
- Chez l'homme, la production de sperme peut être réduite ou arrêtée.
- Nausée, vomissements, diarrhée.
- Ulcères ou aphtes buccaux
- Perte des cheveux
- Éruption cutanée et/ou démangeaisons
- Bouffées congestives

ALKERAN peut fausser les résultats d'analyses sanguines. Votre professionnel de la santé décidera du moment propice aux analyses sanguines et en interprétera les résultats.

<b>Effets secondaires graves et mesure à prendre</b>			
<b>Symptôme ou effet</b>	<b>Communiquez avec votre professionnel de la santé</b>		<b>Cessez de prendre le médicament et consultez un médecin immédiatement</b>
	<b>Uniquement si l'effet est sévère</b>	<b>Dans tous les cas</b>	
<b>TRÈS FRÉQUENT</b>			
<b>Myélosuppression</b> : signes et symptômes d'infections (dont fièvre, frissons, mal de gorge, ulcérations buccales), fatigue, tendance aux ecchymoses, saignement du nez, des gencives ou de la bouche, petits points rouges sur la peau, éruption cutanée, essoufflement, pâleur de la peau, des lèvres et du lit unguéal.		X	
<b>RARE</b>			
<b>Réaction allergique</b> : Enflure du visage, des lèvres, de la langue ou de la gorge, difficulté à respirer, éruption cutanée, urticaire, battements de cœur rapides			X
<b>Troubles du foie</b> : jaunissement des blancs des yeux ou de la peau, urine foncée, douleur abdominale, nausée, vomissements, perte d'appétit		X	
<b>Troubles pulmonaires (pneumonie interstitielle ou inflammatoire)</b> : mortels avec soudaine aggravation de l'essoufflement, respiration sifflante, endormissement, possiblement accompagné de toux ou de fièvre, respiration douloureuse			X

En cas de symptôme ou de malaise non mentionné dans le présent document ou d'aggravation d'un symptôme ou d'un malaise vous empêchant de vaquer à vos occupations quotidiennes, parlez-en à votre professionnel de la santé.

### Déclaration des effets secondaires

Vous pouvez déclarer les effets secondaires soupçonnés d'être associés avec l'utilisation de produits de santé à Santé Canada en :

- Visitant le site Web des déclarations des effets indésirables (<https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medeffet-canada/declaration-effets-indesirables.html>) pour vous informer sur comment faire une déclaration en ligne, par courrier, ou par télécopieur; ou en
- Téléphonant sans frais au 1 866 234-2345.

*REMARQUE : Consultez votre professionnel de la santé si vous avez besoin de renseignements sur le traitement des effets secondaires. Le Programme Canada Vigilance ne donne pas de conseils médicaux.*

### Entreposage :

- Entreposer les comprimés ALKERAN au réfrigérateur, à une température comprise entre 2 °C et 8 °C.
- Garder hors de la portée et de la vue des enfants.

### Pour en savoir davantage au sujet d'ALKERAN :

- Parlez-en avec votre professionnel de la santé
- Vous pourriez vouloir lire de nouveau ce dépliant. **Veillez ne pas le jeter** jusqu'à ce que vous ayez fini de prendre ce médicament.
- Consultez la monographie de produit intégrale rédigée à l'intention des professionnels de la santé, qui renferme également les renseignements pour le patient sur le médicament. Ce document est publié sur le site Web de Santé Canada (<https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medicaments/base-donnees-produits-pharmaceutiques.html>); le site Web du fabricant [www.aspenpharma.ca](http://www.aspenpharma.ca), ou peut être obtenu en appelant le 1 844 330-1213.

Ce dépliant a été rédigé par Aspen Pharmacare Canada Inc.

Dernière révision : le 23 septembre 2022

Les marques de commerce sont la propriété de, ou exploitées sous licence par, le Groupe de sociétés Aspen.